

# Marchitez del plátano

Es causada por el hongo *F. oxysporum* f. sp. *cupense*. Existen varias razas de este patógeno, sin embargo **la Raza 4 Tropical (Foc R4T)** se considera **altamente virulenta y destructiva**.

**Más del 80 %** de los bananos y plátanos que se producen en el mundo son **susceptibles** a este patógeno.

**Foc R4T** es una plaga **ausente en México** que **recientemente se detectó en Colombia**.



## SÍNTOMAS EXTERNOS

- Amarillamiento uniforme de las hojas adultas a lo largo del margen foliar que se extiende hacia la nervadura central de la hoja.
- Las hojas se marchitan, adquieren un color café y permanecen adheridas a la planta.
- Puede presentarse agrietamiento en la base del pseudotallo.
- Necrosis y doblez de peciolo.

## PREVENCIÓN

- ✓ **Restringir el ingreso al país de cormos y plantas**, así como **artesanías o artículos elaborados con fibras de musáceas** y materiales de empaque de *Musa* spp. y otras plantas hospedantes, **procedentes u originarias de Asia, Australia y Colombia**.
- ✓ **Vigilancia** activa en zonas productoras.
- ✓ **Diagnóstico** en laboratorio de muestras con síntomas similares a partir de haces vasculares del pseudotallo.

## SÍNTOMAS INTERNOS

Cambio de color de los haces vasculares que se observa al cortar las raíces, el cormo o el pseudotallo.



Si observas síntomas parecidos

**Notifica**

01 800 987 98 79

[alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx](mailto:alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx)



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SENASICA**  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



[gob.mx/senasica](https://gob.mx/senasica)